



MAPAfarma es un servicio integral y completo de la farmacia que incluye

1. Información al paciente y, en su caso, recogida de la autorización necesaria para el correspondiente seguimiento.
2. Activación y colocación del dispositivo para la recogida de datos para su utilización durante 24/48 horas.
3. Retirada del dispositivo al paciente.
4. Transferencia y almacenamiento de datos, análisis de los mismos y entrega de información al paciente, con derivación al médico, en su caso.
5. Seguimiento del paciente para un mejor control de la presión arterial y del riesgo vascular asociado a ésta.

Farmacia:

Colegiado n°:

Descárguese aquí toda la información >>



www.cacof.es



Su tensión 24 horas

BAJO CONTROL

Pida en **ESTA FARMACIA**
el servicio de medición
24 horas de la Presión Arterial



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos

MAPA 
farma 

Monitorización Ambulatoria
de la Presión Arterial

¿Qué es la Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial?

- ▶ Es una prueba que permite medir su tensión arterial durante 24 horas, tanto durante el día como durante la noche, mientras que usted realiza su actividad normal.
- ▶ Es el mejor método disponible para saber si tiene hipertensión y en caso de tenerla y estar tratado, saber si el control es adecuado.
- ▶ No es una prueba peligrosa ni dañina.
- ▶ Debe acudir habiendo tomado su medicación y con una manga corta o prenda no ajustada al brazo.
- ▶ El aparato se retirará a las 24 horas de su colocación. En ese momento o con posterioridad, los resultados le serán entregados en mano para que se los lleve al médico para su evaluación.
- ▶ El día de su retirada debe facilitar información sobre las dosis de todos los medicamentos que esté tomando, a qué horas los ha tomado y sobre la hora a la que se ha acostado y levantado.



¿Para qué personas está indicada?

La realización de esta prueba está indicada para:

- ▶ Pacientes en los que hay sospecha de HTA aislada (Hipertensión arterial de 'bata blanca').
- ▶ Pacientes en los que hay sospecha de HTA enmascarada.
- ▶ Pacientes con variabilidad de la HTA en consulta durante la misma o varias visitas.
- ▶ Pacientes con mal control de su HTA pese a estar en tratamiento farmacológico.
- ▶ Sospecha de episodios de Hipotensión, especialmente en ancianos y diabéticos.
- ▶ HTA en embarazo y sospecha de preeclampsia.
- ▶ Pacientes con sospecha de alteraciones del sueño (apnea).

