

MEDICAMENTOS: EFECTOS SOBRE LA CONDUCCIÓN

TRATAMIENTO PARA...	FÁRMACOS	SUEÑO	EUFORIA	MAREO	HIPOTENSIÓN	VISIÓN BORROSA	OTROS EFECTOS	SE ACONSEJA
LOS DOLORS	ANALGÉSICOS NARCÓTICOS							No conducir durante el tratamiento
DORMIR Y LOS NERVIOS	ANSIOLÍTICOS E HIPNÓTICOS					Alteraciones de la coordinación		No conducir al comienzo del tratamiento o tras el cambio de dosis
	ANTIDEPRESIVOS					Fatiga		
	ANTISICÓTICOS						Discinesia	
	PSICOESTIMULANTES					Nerviosismo, Temblor		Conducir con precaución
LOS RESFRIADOS, LA TOS Y LOS BRONQUIOS	ANTITUSÍGENOS		Conducir con precaución					
	ANTIHIISTAMÍNICOS (algunos)							Ansiedad Insomnio
LA CIRCULACIÓN Y LA TENSIÓN	VASODILATADORES Y ANTIHIPERTENSIVOS					Conducir con precaución		

PARA CUALQUIER DUDA, CONSULTA CON TU FARMACÉUTICO

Enfermedades que dificultan la conducción



Cardíacas



ARRITMIA

Puede originar pérdida de atención.



ANGINA DE PECHO

Falta de concentración.



INFARTO

Se desaconseja conducir, si ha habido cirugía coronaria, se puede conducir al cabo de tres meses.



INSUFICIENCIA CARDIACA

Falta de concentración, somnolencia.



Neurológicas



PARKINSON

Dificultades para la ejecución automática de movimientos aprendidos, estados súbitos de somnolencia.



ALZHEIMER

Problemas de cognición, dificultades para la medición de espacios, falta de concatenación de movimientos.



EPILEPSIA

Pérdida de concentración, falta de concatenación de movimientos.



Alérgicas



RINITIS ALÉRGICA

Pérdida de eficacia, falta de atención, reducción de la concentración, menor coordinación visual.



ASMA BRONQUIAL

Falta de concentración, dificultad de movimientos.



Respiratorias



ENFISEMA PULMONAR

Reducción de la concentración.



BRONQUITIS CRÓNICA

Pérdida de eficacia, falta de atención.



DISNEA

Falta de concentración, somnolencia.



APNEAS OBSTRUCTIVAS DEL SUEÑO

Somnolencia, falta de atención.

Es una campaña del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos